


BIMADOC[®] Monodose senza conservanti¹

Bimatoprost 0,3 mg/ml collirio, soluzione

Efficacia ipotonizzante⁴

◊ Riduzione statisticamente significativa della IOP dopo switch da terapia oculare ipotonizzante[†] a Bimatoprost senza conservante⁴



Studio prospettico, non interventistico, in aperto, condotto su un totale di **1.830 pazienti** con diagnosi di glaucoma primario ad angolo aperto o ipertensione oculare con pressione intraoculare (IOP) ≥ 18 mmHg in almeno un occhio.⁴

La IOP è stata misurata al basale e dopo 12 settimane di trattamento, durante la visita finale. I pazienti sono passati da un trattamento ipotonizzante precedente a Bimatoprost 0,03 % (senza conservanti una goccia al giorno per occhio), per motivazioni cliniche (insufficiente controllo della IOP nel 73,9% dei casi).⁴

[†] Terapia oculare ipotonizzante al basale: Tafluprost (PF), Latanoprost (PF), Latanoprost (P), Travoprost (NS), Timolol (NS), Timolol (PF), Bimatoprost (P), Timolol/dorzolamide (P), Brinzolamide (P), Dorzolamide (P). Latanoprost (NS). PF: senza conservanti; P: con conservanti; NS: non specificato.

*Dati riportati per pazienti che hanno fornito dati completi (n=1.543, in entrambe le visite)

Dep. AIFA 04/04/2018